

**Příbalová informace: informace pro pacienta**  
**Sildenafil 100 mg šumivé tablety**  
**Kamagra Fizz**

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co jsou Kamagra šumivé tablety a k čemu se používají
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamagra šumivé tablety užívat
3. Jak se Kamagra šumivé tablety užívají
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kamagra šumivé tablety uchovávat
6. Další informace

### **1. Co je přípravek Kamagra šumivé tablety a k čemu se používají**

Přípravek Kamagra šumivé tablety je lék ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Účinkuje tak, že při sexuálním vzrušení uvolňuje krevní cévy v penisu a tím umožňuje přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek Kamagra Fizz Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Šumivé tablety Kamagra se používají k léčbě dospělých mužů s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamagra šumivé tablety užívat**

**Neužívejte přípravek Kamagra Fizz:**

- Jestliže jste alergický (hypersenzitivní) na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
- Pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože tato kombinace může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože tato kombinace může také způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

Pokud užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například Kamagra, bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si nejste jisti, informujte svého lékaře.

- Pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu funkce jater.
- Pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mozkovou mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
- Pokud máte některé vzácné dědičné onemocnění oka (jako např. *retinitis pigmentosa*).
- Pokud jste přišel o zrak v důsledku nearteriální přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

### **Upozornění a opatření**

Před užitím přípravku Kamagra Fizz se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

- jestliže máte srpkovitou anémii (poruchu červených krvinek), leukémii (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetný myelom (nádorové onemocnění kostní dřeně),

- jestliže máte deformitu penisu nebo Peyronieovu chorobu,
- jestliže máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku,
- jestliže máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii),
- jestliže zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek Kamagra šumivé tablety a okamžitě vyhledejte svého lékaře.
- současně s přípravkem Kamagra Fizz neužívejte k léčbě poruchy erekce žádný jiný přípravek podávaný ústy nebo místně.
- neužívejte Kamagra šumivé tablety současně s léky na plicní arteriální hypertenzi (PAH) obsahující sildenafil nebo jiný inhibitor PDE5.
- neužívejte Kamagra šumivé tablety, jestliže nemáte erektilní dysfunkci.
- nesmíte užívat Kamagra šumivé tablety, jestliže jste žena.

*Zvláštní opatrnost u pacientů s ledvinovými nebo jaterními problémy:*

Jestliže trpíte ledvinovým nebo jaterním onemocněním, Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku.

### **Děti a dospívající**

Přípravek Kamagra Fizz není určen pro děti a dospívající do 18 let.

### **Další léčivé přípravky a Kamagra šumivé tablety**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval, nebo které možná budete užívat.

Přípravek Kamagra Fizz může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudi srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek Kamagra šumivé tablety a kdy. Neužívejte přípravek Kamagra Fizz společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte Kamagra šumivé tablety, pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože jejich souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek Kamagra Fizz, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit, protože jejich souběžné užití může způsobit potenciálně nebezpečné snížení krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte riocigvát.

- Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě HIV, doporučí Vám obvykle Váš lékař začít užívat sildenafil v dávce 25 mg.

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty, mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití sildenafilu s alfa-blokátory. Výše uvedené příznaky se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání přípravku Kamagra šumivé tablety. Aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků, měl byste být na stálé denní dávce alfa-blokátoru, než začnete užívat přípravek Kamagra Fizz. Lékař může zahájit Vaši léčbu sildenafilem nižší dávkou (25 mg).

### **Užívání přípravku Kamagra šumivé tablety s jídlem a pitím**

Přípravek Kamagra šumivé tablety může být užíván s jídlem i bez jídla. Po požití těžkého jídla se však účinek přípravku Kamagra Fizz může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Kamagra šumivé tablety nepožívat větší množství alkoholu.

### **Těhotenství, kojení a plodnost**

Přípravek Kamagra Fizz není určen pro použití u žen.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Kamagra šumivé tablety může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek Kamagra Fizz před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

### 3. Jak se Kamagra šumivé tablety užívají

Vždy užívejte přípravek Kamagra Fizz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg. Tabletu je možno dělit na stejné čtvrtiny. Šumivá tableta se užívá bez ohledu na jídlo, rozpuštěná v 1/2 sklenice vody. Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety. Lék užíjte zhruba 30 minut před plánovaným pohlavním stykem.

**Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Kamagra šumivé tablety denně.**

Jestliže máte pocit, že přípravek Kamagra šumivé tablety účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Kamagra Fizz Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou.

Pokud po užití přípravku Kamagra šumivé tablety nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

#### **Jestliže jste užil více přípravku Kamagra Fizz, než jste měl**

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnosti. Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost.

Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užíjete více tablet, než jste měl.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kamagra Fizz nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím sildenafilu bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

**Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Kamagra šumivé tablety užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:**

- Alergická reakce - k té dochází **méně často** (může postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Príznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličej, rtů nebo hrdla.

- Bolest na hrudi - k té dochází **méně často**

Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:

- posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat

- **neužívejte** na léčbu bolesti na hrudi nitráty.

- Prodloužená a občas bolestivá erekce – k té dochází **vzácně** (může postihnout až 1 z 1000 pacientů)

Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

- Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku – k těm dochází **vzácně**
- Těžké kožní reakce – k těm dochází **vzácně**

Príznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu a kolem očí, horečku.

- Křečové stavy nebo záchvaty – k těm dochází **vzácně**

**Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):**

- bolest hlavy

**Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):**

- zarudnutí v obličejí
- návaly horka (příznaky zahrnují náhlý pocit horka v horní části těla)
- nevolnost (nauzea)

- zažívací potíže
- změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo snížené ostrosti vidění)
- ucpaný nos
- závrať

**Méně časté nežádoucí účinky** (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

- zvracení
- kožní vyrážka
- podráždění oka
- překrvené/červené oči
- bolest očí
- vidění záblesků světla
- zrakový vjem jasu
- citlivost na světlo
- bušení srdce
- zrychlená srdeční frekvence
- vysoký krevní tlak
- nízký krevní tlak
- bolest svalů
- ospalost
- snížená citlivost na dotek
- poruchy rovnováhy (závratě)
- zvonění v uších
- sucho v ústech
- ucpané vedlejší dutiny nosní
- zánět sliznice nosu (příznaky zahrnují rýmu, kýchání a ucpaný nos)
- bolest horní poloviny břicha
- refluxní choroba jícnu
- únava
- pocit horka
- bolest horních nebo dolních končetin
- krvácení z nosu
- přítomnost krve v moči
- slzení očí

**Vzácné nežádoucí účinky** (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

- srdeční infarkt
- nepravidelný srdeční tep
- mdloby
- cévní mozková příhoda
- dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku
- pocit stažení hrdla
- zncitlivění úst
- krvácení na očním pozadí
- dvojité vidění
- snížená ostrost vidění
- neobvyklý pocit v oku
- otok oka nebo očního víčka
- malé částice nebo tečky ve Vašem vidění
- vidění světelných kruhů kolem světla

- rozšíření oční zornice
- zbarvení očního bělma
- krvácení z penisu
- přítomnost krve ve spermatu
- sucho v nose
- zduření uvnitř nosu
- pocit podrážděnosti
- náhlé zhoršení sluchu nebo jeho ztráta

***Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh***

- nestabilní angina pectoris (onemocnění srdce)
- náhlá smrt

Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím přípravku Kamagra Fizz.

**Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

**5. Jak přípravek Kamagra šumivé tablety uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky pro uchování.

Nepoužívejte šumivé tablety Kamagra po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabici nebo blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

**6. Obsah balení a další informace**

**Co přípravek Kamagra šumivé tablety obsahuje**

Léčivou látkou je sildenafil. Jedna tableta obsahuje sildenafilum 100 mg ve formě sildenafilu citrát