

Příbalová informace: informace pro pacienta
Super Kamagra 160 mg potahované tablety
Sildenafil 100 mg a Dapoxetin 60 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Složení

Léčivými látkami jsou sildenafil a dapoxetin. Jedna tableta přípravku Super Kamagra obsahuje 100 mg sildenafilu a 60 mg dapoxetinu

Indikace: Co je přípravek Super Kamagra a k čemu se používá

Super Kamagra je lék užívaný u mužů k léčbě erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace. Erekttilní dysfunkce je porucha, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztotožnění pohlavního údu nebo je toto ztotožnění nedostatečné pro pohlavní styk. Předčasná ejakulace je stav, kdy dochází k ejakulaci (výronu semene) záhy po začátku pohlavního styku (dle přesné definice do 1 minuty), aniž by ji muž dokázal oddálit. To muži způsobuje problémy a může to způsobit problémy v sexuálním vztahu.

Přípravek Super Kamagra obsahuje léčivou látku sildenafil, což je lék ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Sildenafil pomáhá navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Přípravek Super Kamagra také obsahuje léčivou látku dapoxetin. Ta patří do skupiny látek zvaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Netrpíte-li erektilní dysfunkcí a předčasnou ejakulací, přípravek Super Kamagra pro Vás není určen.

Je nutno poznamenat, že přípravek Super Kamagra není účinný bez sexuálního dráždění.

Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na sexuální poruchy.

Kontraindikace: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Super Kamagra užívat

Neužívejte Super Kamagra:

- jestliže jste alergický na sildenafil, dapoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
- pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků

předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).
Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

- pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit, protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
- jestliže užíváte riociguát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního tlaku v plicích sekundárních krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například sildenafil, bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku.
- pokud užíváte léky na depresi zvané „inhibitory monoaminoxidázy“ (IMAO), thioridazin k léčbě schizofrenie, jiné léky na depresi, lithium k léčbě bipolární afektivní poruchy, antibiotikum linezolid, tryptofan, třezalku tečkovanou, tramadol, léky k léčbě migrény.
- pokud užíváte léky na léčbu plísňových infekcí včetně ketokonazolu a itrakonazolu, léky na léčbu HIV včetně ritonaviru, sachinaviru, nelfinaviru a atazanaviru, některá antibiotika na léčbu infekcí včetně telithromycinu
- jestliže užíváte Nefazodon

Neužívejte přípravek Super Kamagra současně s žádným lékem uvedeným výše. Pokud jste užíval některý z těchto léků, je nutno před zahájením užívání přípravku Super Kamagra počkat minimálně 14 dní po ukončení léčby výše uvedeného léku. Pokud jste přestal užívat přípravek Priligy, je do zahájení léčby kterýmkoli lékem uvedeným výše nutno počkat 7 dní. Pokud si nejste jistý, poraďte se před užíváním tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem

- pokud máte závažnou srdeční poruchu.
- Jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater.
- pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
- pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. *retinitis pigmentosa*).
- pokud jste přišel o zrak v důsledku neareritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).
- pokud jste v minulosti omdlel.
- pokud jste v minulosti trpěl mánií (příznaky zahrnují pocity nadměrného nadšení, podráždění nebo neschopnost jasně myslet) nebo závažnou depresi.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Super Kamagra se poraďte se svým lékařem, pokud:

- u Vás nebyla diagnostikována předčasná ejakulace;
- máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku;
- jste měl v minulosti závrať v důsledku nízkého krevního tlaku;
- trpíte srpkovitou anémií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).
- užíváte rekreační drogy jako je extáze, LSD, opiáty nebo benzodiazepiny;
- pijete alkohol ;
- jste kdykoli v minulosti měl duševní problémy jako depresi, mánií (příznaky zahrnují pocit nadměrného nadšení, podráždění nebo neschopnost jasně přemýšlet), bipolární poruchu (příznaky zahrnují závažné střídání nálad mezi mánií a depresí) nebo schizofrenii (psychiatrické onemocnění);
- máte epilepsii (padoucnici);
- jste kdykoli v minulosti měl krvácivé stavy nebo poruchu krevní srážlivosti;
- máte vředovou chorobu nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii).
- máte poruchu funkce ledvin;

- máte riziko vysokého očního tlaku (glaukom).
- trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.
- zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku. Přestaňte užívat přípravek Super Kamagra a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo pokud si nejste jistý), poraďte se před užíváním tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před zahájením léčby tímto přípravkem má Váš lékař provést vyšetření, kterým se ujistí, že Vám příliš neklesne krevní tlak, jestliže se z lehu postavíte.

Děti a dospívající

Tento přípravek nesmí užívat děti a dospívající ve věku do 18 let.

Přípravek Super Kamagra není určen pro ženy

Nežádoucí účinky: Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Super Kamagra a ihned vyhledejte lékaře, pokud:

- Máte záchvaty (křeče).
- Máte závrať nebo se Vám točí hlava, když se postavíte.
- Pozorujete jakoukoli změnu nálady.
- Máte sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození.

Pokud pozorujete cokoli z výše uvedeného, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře.

Mdloby a nízký krevní tlak

Tento přípravek může způsobit mdloby nebo pokles krevního tlaku, když se postavíte. Chcete-li pomoci snížit pravděpodobnost, že k tomu dojde:

- Zapijte tento přípravek nejméně jednou plnou sklenicí vody.
- Neužívejte tento přípravek, pokud jste dehydratovaný (nemáte v těle dostatek tekutin).

To se může stát, pokud:

- Jste v posledních 4 až 6 hodinách neměl nic k pití.
- Jste se dlouhou dobu potil.
- Máte chorobu doprovázenou vysokou teplotou, průjmem nebo zvracením.
- Pokud se cítíte na omdlení (pocit nevolnosti, závratí, točení hlavy, zmatenosti, pocení nebo poruchy srdečního rytmu) nebo se Vám točí hlava, když se postavíte, položte se ihned tak, aby Vaše hlava byla níže než zbytek těla, nebo se posaďte s hlavou mezi kolena a setrvejte tak, dokud se nebudete cítit lépe. To Vás ochrání proti pádu a poranění, pokud omdlíte.
- Nevstávejte rychle, pokud jste dlouhou dobu seděl nebo ležel.
- Neříd'te motorová vozidla a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se při užívání tohoto přípravku cítíte na omdlení.

Pokud při užívání tohoto přípravku omdlíte, sdělte to svému lékaři.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolesti hlavy a zažívací obtíže. Často jsou hlášeny bolesti v zádech, bolesti svalů, překrvení nosní sliznice, zarudnutí obličeje a závratě. Méně často se vyskytují otoky víček, bolest očí a zarudlé oči.

Pokud se u vás některý z uvedených nežádoucích účinků vyskytl a působil Vám obtíže, byl závažný nebo přetrvával, oznamte to svému lékaři. Mohou se objevit i alergické reakce (včetně kožní vyrážky, otoků tváře a kopřivky).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 mužů):

- mdloby nebo pocit závratě po postavení se (viz výše);

- změna nálady, pocit nadměrného nadšení nebo paranoidní pocity;
- pocit zmatenosti, dezorientace nebo nemožnost jasně myslet;
- pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus nebo zrychlení tepu;
- ztráta sexuální chuti, problémy s dosažením orgasmu;
- pocit slabosti, útlumu, letargie (otupělost) nebo únavy;
- pocit deprese, nervozity nebo lhostejnosti;
- pocit horka, nervozity, nenormálnosti nebo opilsti;
- problémy se zrakem, bolest oka nebo rozšířené zornice;
- nízký nebo vysoký krevní tlak;
- pocit svědění nebo studeného potu;
- pocit točení hlavy;
- poruchy chuti;
- skřípání zubů.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 mužů):

- pocit závratě po námaze;
- náhlé usínání;
- rychlé nutkání na stolicí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce: Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože různé léky na sebe mohou vzájemně působit. Je to důležité zejména v případě, že jste léčen **nitráty**. V takovém případě byste neměl Super Kamagra užívat. K léčbě vysokého krevního tlaku a zvětšené prostaty bývají někdy užívány léky nazývané **alfa-blokátory**. Informujte lékaře, pokud jste léčen pro některý z těchto zdravotních problémů.

Neužívejte přípravek Super Kamagra spolu s žádným z následujících uvedených léků:

- Nitráty, léky schopné uvolňovat NO
- Alfa-blokátory
- Riocigvát
- Léky na deprese zvané „inhibitory monoaminoxidázy“ (IMAO).
- Thioridazin na léčbu schizofrenie.
- Jiné léky na depresi.
- Lithium – lék na léčbu bipolární poruchy.
- Linezolid – antibiotikum na léčbu infekcí.
- Tryptofan – lék ke zlepšení spánku.
- Třezalka tečkovaná – rostlinný lék.
- Tramadol – užívaný na silnou bolest.
- Léky na léčbu migrény.
- Některé léky na léčbu plísňových infekcí včetně ketokonazolu a itraconazolu.
- Některé léky na léčbu HIV včetně ritonaviru, sachinaviru, nelfinaviru a atazanaviru.
- Některá antibiotika na léčbu infekcí včetně telithromycinu.
- Nefazodon – antidepresivum.

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

- Léky na duševní problémy jiné než deprese.
- Nesteroidní protizánětlivé léky, jako je ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová.
- Léky na ředění krve jako je warfarin.
- Některé léky užívané k léčbě erektilní dysfunkce jako je sildenafil, tadalafil nebo vardenafil, protože tyto léky mohou snižovat krevní tlak, zejména když se postavíte.
- Některé léky na léčbu vysokého krevního tlaku a bolesti na hrudi (anginy pectoris) jako je verapamil a diltiazem, nebo zvětšené prostaty, protože tyto léky mohou také snižovat Váš krevní tlak, zejména když se postavíte.
- Některé jiné léky na léčbu plísňových infekcí jako flukonazol.
- Některé další léky na léčbu HIV jako amprenavir a fosamprenavir.
- Některá další antibiotika na léčbu infekcí jako erythromycin a klarithromycin.
- Aprepitant – na léčbu pocitu na zvracení.

Pokud si nejste jistý, zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Super Kamagra neužívejte s jinými léky v případě, že vám to lékař nedoporučí.

Přípravek Super Kamagra by neměl být užíván společně s jinými léky na poruchu erekce.

Dávkování: Jak se přípravek Super Kamagra užívá

Vždy užívejte přípravek Super Kamagra přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Medikament Super Kamagra se užívá při těchto sexuálních dysfunkcích:

- erektilní dysfunkce a krátká výdrž v sexu (lék je určen ke zlepšení erekce a oddálení ejakulace)
- předčasná ejakulace (ejakulace při předehře nebo do 2 minut při vniknutí do pochvy partnerky)

Přípravek Super Kamagra se podává v dávce předepsané vaším doktorem asi 40 minut před pohlavním stykem. Léčba obvykle začíná dávkou 80 mg (½ tablety Super Kamagra 160 mg). Tablety Super Kamagra jsou určeny k vnitřnímu užití. Tabletou spolkněte celou s trochou vody.

Pokud účinek nebyl dostatečný, nebo lék nezabral, dávka se zvyšuje na celou tabletu 160 mg a to je maximální denní dávka, která nesmí být překročena.

Přípravek Super Kamagra můžete užít nejpozději 50 minut před pohlavním stykem. Přípravek Super Kamagra může být stále účinný až po dobu 5-6 hodin po užití tablety. Je nutno poznamenat, že Přípravek Super Kamagra není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na sexuální dysfunkce. Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na vaši schopnost dosáhnout erekce. Požití alkoholu může způsobit přechodný pokles vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít Super Kamagra, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08% a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

NEUŽÍVEJTE přípravek Super Kamagra častěji než jednou denně. Super Kamagra 160 mg a 80 mg je určen k užití před očekávanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

Předávkování

Jestliže jste užil více přípravku Super Kamagra, než jste měl, oznamte to svému lékaři. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění: Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto přípravku můžete pociťovat ospalost, závrať, pocit na omdlení a mít problémy s koncentrací nebo rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto nebo podobné účinky vyskytnou, máte se vyvarovat řízení dopravních prostředků nebo obsluhy nebezpečných strojů

Uchovávání: Jak přípravek Cialis uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Super Kamagra nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a blistru.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.