

**Europe-Pharm**



Choix  
des DOSAGES et PAQUETS

Prix

## NOTICE : INFORMATION POUR UTILISATEUR

Levitra générique 20 mg, comprimé pelliculé  
Vardénafil

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1. Qu'est-ce que Levitra générique et dans quel cas est-il utilisé**
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Levitra**
- 3. Comment prendre Levitra générique**
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels**
- 5. Comment conserver Levitra générique**
- 6. Informations supplémentaires**

### **1. QU'EST-CE QUE LEVITRA GÉNÉRIQUE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ**

Levitra générique contient du vardénafil, qui appartient à la famille de médicaments appelée inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Ces médicaments sont utilisés dans le traitement de la dysfonction érectile chez l'homme adulte, une maladie ayant pour conséquences des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection.

Au moins un homme sur dix présente parfois des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection. Les

causes peuvent être d'ordre physique ou psychologique, ou le plus souvent, un mélange des deux. Quelle que soit la cause, en raison d'une modification des muscles et des vaisseaux sanguins, il ne reste pas assez de sang au niveau du pénis pour le rendre et le maintenir rigide.

Levitra générique agira seulement en cas de stimulation sexuelle. Il réduit l'action d'une substance chimique de l'organisme qui met fin à l'érection. Levitra permet une érection d'une durée suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LEVITRA GÉNÉRIQUE**

Ne prenez jamais Levitra générique

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au vardénafil ou à l'un des autres composants contenus dans Levitra générique. Voir les composants cités en rubrique 6. Les signes d'une réaction allergique peuvent être des réactions cutanées, des démangeaisons, un gonflement du visage ou des lèvres et une respiration courte.
- Si vous prenez des médicaments contenant des dérivés nitrés tels que la nitroglycérine pour l'angor ou des donneurs de monoxyde d'azote comme le nitrite d'amyle, l'utilisation de Levitra générique peut modifier sérieusement votre tension artérielle.
- Si vous prenez actuellement du ritonavir ou de l'indinavir, des médicaments utilisés pour traiter les infections dues au virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
- Si vous avez plus de 75 ans et que vous êtes actuellement traité par du kétoconazole, de l'itraconazole ou un médicament anti-fongique.
- Si vous avez de graves problèmes cardiaques ou du foie.
- Si vous êtes sous dialyse rénale.
- Si vous avez eu récemment un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque.
- Si vous avez eu, ou avez une faible tension artérielle.
- Si votre famille présente des antécédents de maladies dégénératives des yeux (comme la rétinite pigmentaire).
- Si vous avez déjà présenté une pathologie incluant une perte de la vision due à l'atteinte du nerf

optique liée à un apport sanguin insuffisant appelée neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN).

### **Faites attention avec Levitra générique**

- Si vous avez des troubles cardiaques, il peut être risqué pour vous d'avoir une activité sexuelle.
- Si vous souffrez d'irrégularités du rythme cardiaque (arythmies cardiaques) ou de maladies cardiaques héréditaires affectant votre électrocardiogramme.
- Si vous avez une malformation anatomique du pénis telle que l'angulation, la maladie de La Peyronie et la sclérose des corps caverneux.
- Si vous avez une maladie pouvant être à l'origine d'érections qui ne cessent pas (priapisme). Ces maladies sont la drépanocytose, le myélome multiple et la leucémie.
- Si vous avez un ulcère à l'estomac (aussi appelé ulcère gastrique).
- Si vous avez des troubles de la coagulation (tel que l'hémophilie).
- Si vous utilisez d'autres traitements pour la dysfonction érectile, dont Levitra générique, comprimé orodispersible. Voir "Prise d'autres médicaments".
- Si vous ressentez une diminution ou une perte soudaine de la vision, arrêtez de prendre Levitra générique et contactez immédiatement votre médecin.

### **Utilisation chez les enfants**

Levitra générique n'est pas destiné à être utilisé chez les enfants ou les adolescents de moins de 18 ans.

### **Prise d'autres médicaments:**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Certains médicaments peuvent poser problème, particulièrement les suivants :

Les dérivés nitrés, médicaments pour traiter l'angine de poitrine, ou les donneurs de monoxyde d'azote comme le nitrite d'amyle. Prendre ces médicaments avec Levitra générique peut modifier sérieusement votre tension artérielle. Parlez-en à votre médecin avant de prendre Levitra générique.

Médicaments pour le traitement des arythmies tels que la quinidine, la procainamide, l'amiodarone ou le sotalol.

Le ritonavir ou l'indinavir, médicaments contre le HIV. Parlez-en à votre médecin avant de prendre Levitra générique.

Le kétoconazole ou l'itraconazole, médicaments antifongiques.

L'érythromycine ou la clarithromycine, antibiotiques appartenant à la classe des macrolides.

Les alpha-bloquants, médicaments utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'augmentation du volume de la prostate (hyperplasie bénigne de la prostate).

Ne prenez pas de comprimés pelliculés Levitra générique en association avec d'autres traitements pour la dysfonction érectile, dont Levitra, comprimé orodispersible.

### **Aliments et boissons**

Vous pouvez prendre Levitra générique avec ou sans nourriture, mais de préférence pas après un repas lourd ou riche en graisses car cela pourrait retarder l'effet.

Ne buvez pas de jus de pamplemousse lorsque vous prenez du Levitra générique. Cela peut interférer avec l'effet habituel du médicament.

Les boissons alcoolisées peuvent rendre l'érection plus difficile.

### **Grossesse et allaitement**

Levitra générique n'est pas indiqué chez la femme.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Levitra générique peut chez certaines personnes entraîner des sensations vertigineuses ou des troubles de la vision. Si vous avez des vertiges ou si votre vision est modifiée après la prise de Levitra générique, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'instruments ou de machines.

### 3. COMMENT PRENDRE LEVITRA GÉNÉRIQUE

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle est 10 mg.

Prendre un comprimé de Levitra générique environ 25 à 60 minutes avant une relation sexuelle. En cas de stimulation sexuelle vous pouvez obtenir une érection à partir de 25 minutes, jusqu'à 4 à 5 heures après la prise de Levitra générique.

Avalez le comprimé avec un verre d'eau.

Ne prenez jamais Levitra générique, comprimé pelliculé en même temps qu'une autre forme de Levitra.

Ne prenez pas de Levitra générique plus d'une fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de Levitra générique est trop fort ou trop faible, informez-en votre médecin.

Il pourra vous proposer une autre forme de Levitra générique à une dose différente en fonction de l'efficacité observée.

#### **Si vous avez pris plus de Levitra générique que vous n'auriez dû**

Les hommes qui prennent trop de Levitra générique peuvent être sujets à plus d'effets indésirables et souffrir de maux de dos sévères. Si vous avez pris plus de Levitra générique que vous n'auriez dû, informez votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, Levitra générique peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart de ces effets sont légers à modérés.

Une perte ou une diminution de la vision, partielle, soudaine, temporaire ou permanente au niveau d'un seul œil ou des deux yeux est survenue chez des patients. Arrêtez de prendre Levitra générique et contactez votre médecin immédiatement.

Une diminution ou une perte soudaine de l'audition a été rapportée.

La probabilité de survenue d'un effet indésirable est décrite selon les catégories suivantes :

Très fréquents (affectant plus de 1 personne sur 10)

Maux de tête

Fréquents (affectant 1 à 10 personnes sur 100)

Sensations de vertige

Bouffées de chaleur

Nez qui coule ou nez bouché

Indigestion

Peu fréquents (affectant 1 à 10 personnes sur 1000)

Gonflement au niveau de la peau et des muqueuses, y compris un gonflement au niveau du visage, des lèvres ou de la gorge

Troubles du sommeil

Engourdissement ou déficience du toucher

Somnolence

Effets sur la vision : rougeur des yeux, altération de la vision des couleurs, douleur et inconfort oculaires, sensibilité à la lumière

Bourdonnement des oreilles ; vertiges

Augmentation du rythme cardiaque ou palpitations

Essoufflement

Nez encombré

Remontées acides, gastrite, douleur abdominale, diarrhée, vomissements, écoeurement (nausées),

bouche sèche

Augmentation des taux d'enzymes hépatiques dans le sang

Rash, rougeur de la peau

Douleur dorsale ou musculaire, élévation du taux d'enzyme musculaire dans le sang (créatine phosphokinase), raideur musculaire

Erections prolongées

Malaise

Rares (affectant 1 à 10 personnes sur 10 000)

Inflammation au niveau des yeux (conjonctivite)

Réaction allergique

Anxiété

Evanouissement

Amnésie

Convulsions

Augmentation de la pression oculaire (glaucome), augmentation des sécrétions lacrymales

Effets sur le cœur (tels que crise cardiaque, trouble du rythme, ou angine de poitrine)

Pression artérielle élevée ou basse

Saignement de nez

Altération des résultats sanguins vérifiant la fonction hépatique (foie)

Sensibilité de la peau au soleil

Erections douloureuses

Douleur à la poitrine

Si l'un des effets mentionnés s'aggrave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin.

## 5. COMMENT CONSERVER LEVITRA GÉNÉRIQUE

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Levitra générique après la date de péremption mentionnée sur la boîte après "EXP".

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Levitra générique

- La substance active est le vardénafil. Chaque comprimé contient 20 mg de vardénafil (sous forme de chlorhydrate).