

# Europe-Pharm



Se tillgängliga  
DOSERING och PAKET

[Våra prislista](#)

**Bipacksedel: Information till användaren**  
**Super Kamagra**  
**(sildenafil 100 mg och dapoxetin 60 mg)**

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

**Sildenafil 100 mg**

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Sildenafil är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil
3. Hur du tar Sildenafil
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sildenafil ska förvaras

**1. Vad är och Sildenafil vad det används för**

Sildenafil innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. Sildenafil underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad.

Sildenafil är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.

Sildenafil som finns i Sildenafil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

**2. Vad du behöver veta innan du tar Sildenafil**

## **Ta inte Sildenafil**

om du är allergisk mot sildenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil kan leda till kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

om du tar mediciner som kallas för kväveoxidatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall

om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Sildenafil, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck

om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa)

om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

## **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare innan du tar Sildenafil:

om du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer), multipelt myelom (cancer i benmärgen)

om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom

om du har hjärtproblem. Din läkare ska noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär

om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili)

om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn, sluta ta Sildenafil och kontakta läkare omedelbart.

Du ska inte ta Sildenafil om du inte har erektil dysfunktion.

Du ska inte använda Sildenafil samtidigt med någon annan (peroral eller lokal) behandling mot erektil dysfunktion.

Du ska inte ta Sildenafil om du är kvinna.

Du ska inte använda Sildenafil samtidigt som någon behandling mot pulmonell arteriell hypertension (PAH) som innehåller sildenafil eller några andra PDE5-hämmare.

*Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem*

Du ska tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem. Din läkare kan besluta att din dos ska vara lägre.

## **Barn och ungdomar**

Sildenafil ska inte ges till personer under 18 år.

## **Andra läkemedel och Sildenafil**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Sildenafil tablettorna kan påverka effekten av vissa mediciner speciellt sådana som används för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd att du tagit Sildenafil och när du gjorde det. Ta inte Sildenafil med andra mediciner om inte din läkare säger att du kan göra det.

Du ska inte ta Sildenafil om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom kombinationen av dessa mediciner kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.

Du ska inte ta Sildenafil om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat. Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den lägsta dosen av Sildenafil (25 mg).

En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostataförstoring kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit Sildenafil med alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit Sildenafil. För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast daglig dos innan du börjar ta Sildenafil. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg) Sildenafil.

## **Sildenafil med mat, dryck och alkohol**

Sildenafil kan tas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid kan det ta lite längre tid innan det verkar.

Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Sildenafil ska inte användas av kvinnor.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Sildenafil kan orsaka yrsel och kan påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på Sildenafil innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **3. Hur du tar Sildenafil**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad startdos är 50 mg.

### ***Du ska inte ta Sildenafil mer än en gång per dygn.***

Du ska ta Sildenafil ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

Om du känner att effekten av Sildenafil är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Sildenafil ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för Sildenafil att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme. Du kan märka att det tar längre tid innan Sildenafil verkar om du tar det tillsammans med en kraftig måltid.

Om Sildenafil inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga till din läkare.

*Om du har tagit för stor mängd av Sildenafil*

Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar inte effekten.

***Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.***

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av Sildenafil är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund.

Sluta använda Sildenafil och kontakta genast din läkare om du upplever något av följande allvarliga symtom:

En allergisk reaktion – **mindre vanligt** (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Symtom inkluderar plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar eller hals.

Bröstsmärtor – mindre vanligt. Om detta sker under eller efter samlag:

Res dig upp i halvsittande ställning och försöka slappna av

**Ta inte nitrater** för att behandla bröstsmärtorna

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner - **sällsynt** (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta läkare omedelbart.

Plötslig nedsättning eller förlust av synen – **sällsynt**.

Allvarlig hudreaktion – **sällsynt**. Symtom inkluderar allvarlig fjällning och svullnad i huden, blåsbildning i mun, genitalier och runt ögonen, feber.

Krampanfall – **sällsynt**.

#### **Andra biverkningar:**

**Mycket vanliga** (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk.

**Vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående, ansiktsrodnad, värmevallningar (symtomen kan bland annat vara en plötslig känsla av värme i överkroppen), matsmältningsproblem, förändrat färgseende, dimsyn, synstörningar, nästäppa och yrsel.

**Mindre vanliga** (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkningar, hudutslag, blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärter, att man ser ljusblixtar eller uppfattar ljus som mycket starkt, ljuskänslighet, vattniga ögon, hjärklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck, muskelsmärta, sömnhet, minskad känsel, svindel, öronringningar, muntorrhet, blockerade eller täppta bihålor, inflammation i slemhinnan i näsan (symtomen är bland andra rinnsnuva, nysningar och nästäppa), smärta i övre delen av magen, gastroesofageal refluxsjukdom (symtomen är bland andra halsbränna), närvaro av blod i urinen, smärta i armar eller ben, näsblödning, värmekänsla och trötthetskänsla.

**Sällsynta** (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): svimning, stroke, hjärtattack, oregelbundna hjärtslag, tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan, en känsla av att det blir trångt i halsen, avdomnad mun, blödning i bakre delen av ögat, ögonirritation, sjukdom i näthinnan orsakad av arterioskleros, sjukdomar i regnbågshinnan, dubbelseende, minskad synskärpa, onormal känsla i ögat, svullnad i ögat eller ögonlocket, ökat ögontryck (glaukom), närsynthet, trötta ögon, små prickar eller fläckar i synfältet, att man ser en gloria runt ljuskällor, utvidgade pupiller, missfärgning av ögonvitan, blödning i penis, blod i sädesvätskan, torr näsa, svullnad inuti näsan, lättretlighet och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel.

Efter att läkemedlet har börjat marknadsföras och använts av patienter har sällsynta fall av instabil angina (en typ av hjärtproblem) och plötsligt dödsfall rapporterats. Det är värt att notera att de flesta – men inte alla – av de män som upplevde dessa symtom hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin.

Det är omöjligt att säga om dessa händelser berodde på Sildenafil.

## 5. Hur Sildenafil ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## Dapoxetin 60 mg

### I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Dapoxetin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Dapoxetin
3. Hur du tar Dapoxetin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dapoxetin ska förvaras

### 1. Vad Dapoxetin är och vad det används för

Dapoxetin innehåller en aktiv substans som kallas ”dapoxetin”. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”selektiva serotoninåterupptagshämmare” (SSRI). Dapoxetin kan även benämnas vara ett ”urologiskt” läkemedel.

Dapoxetin förlänger tiden till utlösning och kan förbättra mannens kontroll över utlösningen. Detta kan minska frustrationen eller oron över snabb utlösning.

Dapoxetin används för behandling av för tidig utlösning hos vuxna män i åldern 18 till 64 år.

För tidig utlösning är när en man får utlösning med bara lite sexuell stimulering och innan mannen vill.

Detta kan medföra problem för mannen och kan ge problem i sexuella förhållanden.

### 2. Vad du behöver veta innan du tar Dapoxetin

#### Ta inte Dapoxetin:

- om du är allergisk mot dapoxetin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel
- om du har hjärtproblem såsom hjärtsvikt eller rubbningar i hjärtrytmen
- om du tidigare har svimmat
- om du någonsin har haft mani (symtom som att känna sig överexalterad, irriterad eller inte ha förmågan att tänka klart) eller svår depression
- om du tar:



- läkemedel mot depression, vilka kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)
- tioridazin som används mot schizofreni
- andra läkemedel mot depression
- litium – ett läkemedel mot bipolärt syndrom
- linezolid – ett antibiotikum som används för att behandla infektioner
- tryptofan – ett läkemedel som hjälper dig att sova
- johannesört – ett naturläkemedel
- otamadol – används för behandling av svår smärta
- läkemedel som används för behandling av migrän.

Ta inte Dapoxetin samtidigt med något av de läkemedel som anges ovan. Om du har tagit något av dessa läkemedel, måste du vänta i minst 14 dagar efter att du har slutat att ta det, innan du kan börja ta

Dapoxetin. När du har slutat att ta Dapoxetin, måste du vänta 7 dagar innan du tar något av de läkemedel som anges ovan. Om du är osäker på hur du ska göra, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel (se avsnitt ”Andra läkemedel och Dapoxetin”).

- vissa läkemedel mot svampinfektion, däribland ketokonazol och itrakonazol (se avsnitt ”Andra läkemedel och Dapoxetin”)
- vissa läkemedel mot HIV, däribland ritonavir, sakvinavir, nelfinavir och atazanavir (se avsnitt ”Andra läkemedel och Dapoxetin”)
- vissa antibiotika för behandling av infektion, däribland telitromycin (se avsnitt ”Andra läkemedel och Dapoxetin”)
- nefazodon – ett antidepressivt läkemedel (se avsnitt ”Andra läkemedel och Dapoxetin”)

- om du har måttliga eller allvarliga leverproblem.

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Dapoxetin om du:

- inte har fått diagnosen för tidig utlösning
- även har andra sexuella problem som impotens (erektionsproblem)

- tidigare har känt yrsel på grund av lågt blodtryck
- använder partydroger såsom ecstasy, LSD, narkotika eller bensodiazapiner
- dricker alkohol (se avsnitt ”Dapoxetin med mat, dryck och alkohol”)
- någon gång har haft psykiska problem såsom depression, mani (symtomen är till exempel att man känner sig överdrivet upphetsad, är lättretlig eller inte kan tänka klart), bipolärt syndrom (symtomen inkluderar kraftiga humörsvägningar mellan mani och depression) eller schizofreni (en psykisk sjukdom)
- har epilepsi
- tidigare har haft blödningar eller problem med blodkoagulation
- har njurproblem
- har eller löper risk att få högt tryck i ögat (glaukom).

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Innan du börjar använda detta läkemedel bör din läkare utföra ett test för att försäkra sig om att ditt blodtryck inte sjunker för mycket när du ställer dig upp från liggande ställning.

### **Barn och ungdomar**

Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 års ålder.

### **Andra läkemedel och Dapoxetin**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel, såsom naturläkemedel. Detta beror på att Dapoxetin kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Dessutom kan vissa andra läkemedel påverka hur Dapoxetin verkar. Användning av andra läkemedel kan därför påverka den högsta dosen av Dapoxetin som du får ta.

### **Ta inte Dapoxetin samtidigt som något av följande läkemedel:**

- läkemedel mot depression, vilka kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare)
- tioridazin som används mot schizofreni
- andra läkemedel mot depression
- litium – ett läkemedel mot bipolärt syndrom
- linezolid – ett antibiotikum som används för att behandla infektioner

- tryptofan – ett läkemedel som hjälper dig att sova
- johannesört – ett naturläkemedel
- tramadol – används för behandling av svår smärta
- läkemedel som används för behandling av migrän.

Ta inte Dapoxetin samtidigt med något av de läkemedel som anges ovan. Om du har tagit något av dessa läkemedel, måste du vänta i minst 14 dagar efter att du har slutat att ta det, innan du kan börja ta Dapoxetin. När du har slutat att ta Dapoxetin, måste du vänta 7 dagar innan du tar något av de läkemedel som anges ovan. Om du är osäker på hur du ska göra, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

- vissa läkemedel mot svampinfektion, däribland ketokonazol och itrakonazol
- vissa läkemedel mot HIV, däribland ritonavir, sakvinavir, nelfinavir och atazanavir
- vissa antibiotika för behandling av infektion, däribland telitromycin
- nefazodon – ett antidepressivt läkemedel.

**Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:**

- läkemedel mot psykiska problem förutom depression
- icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller acetylsalicylsyra
- blodförtunnande läkemedel, såsom warfarin
- vissa läkemedel som används för att behandla impotens (erektionsproblem) som sildenafil, tadalafil eller vardenafil, då dessa läkemedel kan sänka blodtrycket, eventuellt när du ställer dig upp
- vissa läkemedel som används för behandling av högt blodtryck och kärlkramp (angina) (såsom verapamil och diltiazem), eller förstörad prostata, eftersom dessa läkemedel också kan sänka ditt blodtryck, eventuellt när du ställer dig upp
- vissa andra läkemedel mot svampinfektion, såsom flukonazol
- vissa andra läkemedel mot HIV såsom amprenavir och fosamprenavir
- vissa andra antibiotika som används för att behandla infektion, såsom erytromycin och klaritromycin
- aprepitant – används för att behandla illamående.

Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

**Dapoxetin med mat, dryck och alkohol**

- Detta läkemedel kan tas oberoende av måltider.

- Du ska ta detta läkemedel med minst ett fullt glas vatten.
- Undvik alkohol när du tar detta läkemedel.
- Effekterna av alkohol såsom att du känner dig yr, sömnig eller får långsamma reaktioner kan öka vid intag tillsammans med detta läkemedel.
- Intag av alkohol samtidigt som du tar detta läkemedel kan öka risken för att du skadar dig om du svimmar eller får andra biverkningar.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Kvinnor ska inte ta detta läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Du kan känna dig sömnig, yr, svimfärdig, få svårt att koncentrera dig och få dimsyn när du tar detta läkemedel. Om du drabbas av någon av dessa eller liknande effekter, ska du undvika att köra fordon eller använda farliga maskiner. Effekterna av alkohol kan öka tillsammans med detta läkemedel och det kan finnas större risk för att du skadar dig om du svimmar eller får andra biverkningar om du tar detta läkemedel tillsammans med alkohol.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Dapoxetin innehåller laktos**

Detta läkemedel innehåller laktos (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

## **3. Hur du tar Dapoxetin**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur du tar Dapoxetin

- Rekommenderad dos är 30 mg. Din läkare kan höja dosen till 60 mg.

- Ta endast läkemedlet 1 till 3 timmar före förväntad sexuell aktivitet.
- Ta inte detta läkemedel oftare än en gång per dygn (var 24:e timme).
- Svälj tabletterna hela för att undvika en bitter smak, med minst ett fullt glas vatten. Detta kan minska risken för att du svimmar.
- Detta läkemedel kan tas oberoende av måltider.
- Detta läkemedel ska inte användas av män under 18 år eller män som är 65 år eller äldre.
- Diskutera din Dapoxetinbehandling med din läkare efter de första 4 veckorna eller efter 6 doser för att avgöra om du skall fortsätta med behandlingen. Om behandlingen fortsätter så skall du träffa din läkare kontinuerligt var 6:e månad för att diskutera fortsatt behandling.

### **Om du har tagit för stor mängd av Dapoxetin**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare eller sjukhus för bedömning av risken samt rådgivning.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du har tagit fler tabletter än du borde. Du kan bli illamående eller kräkas.

### **Om du slutar att ta Dapoxetin**

Tala med din läkare innan du slutar att ta detta läkemedel. Du kan få problem med att sova och känna dig yr när du har slutat att ta detta läkemedel, även om du inte har tagit det varje dag.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Dapoxetin och uppsök omedelbart läkare om du:

- får krampanfall
- svimmar eller känner dig yr i huvudet när du reser dig upp
- märker några humörförändringar
- har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv.

Om du märker något av ovanstående, sluta att ta detta läkemedel och uppsök omedelbart din läkare.

### **Svimning och lågt blodtryck**

Detta läkemedel kan göra att du svimmar eller att blodtrycket sjunker när du reser dig upp. För att minska risken för att detta inträffar:

- Ta detta läkemedel med minst ett fullt glas vatten.
- Ta inte detta läkemedel om du är uttorkad (inte har tillräckligt med vätska i kroppen).

Detta kan inträffa om du:

- inte har druckit någonting under de senaste 4 till 6 timmarna
- har svettats under lång tid
- har en sjukdom med feber, diarré eller kräkningar.
- Om det känns som om du håller på att svimma (om du till exempel känner dig illamående, yr, svimfärdig, förvirrad, svettig eller har onormala hjärtslag) eller känner dig yr i huvudet när du reser dig upp, lägg dig genast ner så att ditt huvud är lägre än resten av kroppen eller sitt ner med huvudet mellan knäna tills du mår bättre. Detta gör att du inte faller och skadar dig om du skulle svimma.
- Res dig inte upp snabbt när du har suttit eller legat ned en längre stund.
- Kör inte fordon eller använd verktyg eller maskiner om du känner dig svimfärdig när du tar detta läkemedel.
- Tala om för din läkare om du svimmar när du tar detta läkemedel.

**Mycket vanliga biverkningar** (kan förekomma hos fler än 1 av 10 män):

- yrsel
- huvudvärk
- illamående.

**Vanliga biverkningar** (kan förekomma hos upp till 1 av 10 män):

- känna sig irriterad, orolig, upprörd eller rastlös
- domningar eller myrkrypningar
- svårighet att få eller behålla en erektion

- svettas mer än normalt eller rodnar
- diarré, förstoppning eller gaser
- magsmärtor, uppsvälldhet eller kräkningar
- sömnsvårigheter eller konstiga drömmar
- trötthet eller sömnighet, gäspningar
- nästäppa
- förhöjt blodtryck
- koncentrationssvårigheter
- skakningar eller darrningar
- minskat intresse för sex
- ringningar i öronen
- dimsyn
- magbesvär
- muntorrhet.

**Mindre vanliga biverkningar** (kan förekomma hos upp till 1 av 100 män):

- svimning eller känsla av yrsel när man reser sig upp (se råden ovan)
- humörförändring, överdriven upphetsning eller paranoida känslor
- känna sig förvirrad, desorienterad eller oförmåga att tänka klart
- långsamma eller oregelbundna hjärtslag eller ökad puls
- förlust av sexualdrift, problem att uppnå orgasm
- känna sig svag, slö eller utmattad
- känsla av nedstämdhet, nervositet eller likgiltighet
- känna sig varm, stirrig, onormal eller berusad
- synproblem, ögonsmärta eller vidgade pupiller
- lågt eller högt blodtryck
- klåda eller kallsvette

- känsla av att det snurrar
- onormal smak
- gnisslar tänder.

**Sällsynta biverkningar** (kan förekomma hos upp till 1 till 1 000 män):

- känna sig yr efter ansträngning
- plötsliga sömnattacker
- plötsliga tarmträngningar.

## **5. Hur Dapoxetin ska förvaras**

- Inga särskilda förvaringsanvisningar.
- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.